



# TATAR

## HAITALLINEN VIERASLAJI

Japanintatar, sahalinintatar ja näiden risteymä tarhatatar tuotiin 1800-luvulla Aasiasta Eurooppaan koristekasveiksi. Niitä nähdään yhä puutarhoissa ja kotipihoilla, josta ne ovat levittäytyneet uusille kasvupaikoille. Nämä kolme lajia leviävät voimakkaasti juurakon sekä juurten palasten avulla ja valtaavat kasvualaa muilta kasveilta. Tattaren juurakko ulottuu hyvin laajalle ja voi aiheuttaa vaurioita salaojiin, sadevesiputkistoihin sekä talojen rakenteisiin.

Tattaret tunnistaa jopa 3–5 metriä korkeasta ja bambumaisesta kasvutavastaan. Japanintattaren lehdet ovat kolmionmuotoiset, kun taas sahalinintattarella ne ovat suuret ja pitkulaiset. Tattaret kukkivat syys-lokakuussa. Kukinto on valkoinen tai vaaleanpunainen ja viuhkamainen. Ethän sekoita haitallisia tattaria suomenröyhytattareen, jonka lehdet ovat kapeammat ja kasvukorkeus jää alle kahteen metriin.

### Torju vieraslaji tai ilmoita havaintosi!

Pienet taimet voi kiskoa juurineen käsin. Pienialaiset kasvustot häviävät yleensä katkaisemalla varret ja peittämällä alue paksulla mustalla muovilla. Suurempien kasvustojen torjumiseen tehokkain keino on varsien katkaiseminen ja torjunta-aineen ruiskuttaminen onttojen varsien sisälle. Lisätietoja tattarista ja niiden torjunnasta sekä mahdollisuus havaintojen ilmoittamiseen -> [vieraslait.fi](https://vieraslait.fi)

