



©Jonas Roth CC BY 4.0

Jonas Roth



©Ulla-Maija Liukko, SYKE, CC-BY-NC-SA-4.0

# MUSTAPÄÄETANA HAITALLINEN VIERASLAJI

Mustapäätana esiintyy luontaisesti Kaukasuksen alueella. 2010-luvulla mustapäätanoita on löydetty vieraslajina muun muassa Virosta, Latviasta, Saksasta ja Valko-Venäjältä. Suomessa laji on tavattu ensimmäisen kerran Sipoossa vuonna 2018. Laji on levittäytynyt Pohjois-Eurooppaan vasta hiljattain, joten sen ekologiasta ja vaikutuksista paikalliseen ekosysteemiin on vasta vähän tietoa, mutta etanoiden runsaslukuisuuden vuoksi haitat ovat todennäköisiä. Mustapäätanat talvehtivat todennäköisesti sekä aikuisina että munina. Laji vaikuttaa kestävästi myös hyvin kylmää, sillä Suomessa lajin on havaittu olevan aktiivinen vielä ensimmäisten pakkasten jälkeenkin.

Mustapäätanan paras tuntomerkki on selvästi mustana erottuvat pää, tuntosarvet ja kaula. Vartalon väri vaihtelee likaisen vaaleasta ruskeaan ja siniharmaaseen. Aikuiset etanat ovat noin 4–5 cm pitkiä. Lajia ei tule sekoittaa harmittomiin ukko- tai metsäetanihin. Mustapäätanan hengitysaukko sijaitsee oikealla kyljellä, kilven takaosassa. Lisäksi kilven pinnassa on hyvässä valossa erottuva sormenjälkikuvio. Takapään kärjestä alkava selkähartanne on lyhyt, vain  $\frac{1}{4}$  -  $\frac{1}{3}$  etanan pituudesta. Etanan lima on kirkasta ja väritöntä.

## Torju vieraslaji tai ilmoita havaintosi!

Mustapäätanan paras torjuntatapa on poimia etanat maastosta, lopettaa ne kiehuvässä vedessä tai leikata etanan pää saksilla sarvien välistä. Nurmikko ja piha-alueen kasvillisuus kannattaa pitää matalana, jolloin etanat eivät löydä suojaa kuivuudelta. Lisätietoja mustapäätanasta ja sen torjunnasta sekä mahdollisuus havaintojen ilmoittamiseen -> [vieraslajit.fi](https://vieraslajit.fi)

## Älä sekoita näihin:



Ukkoetana

©ANDERS ALBRECHT CC BY 4.0



Metsäetana

©PEKKA MALINEN CC BY 4.0